

表 3949 一日透析液使用量(L/日) 年齢(歳)別(腹膜透析患者)

年齢	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)	7 (13.7)	16 (31.4)	11 (21.6)	5 (9.8)	7 (13.7)	1 (2.0)	4 (7.8)	51 (100.0)	46	97	5.43	4.26
15歳～ (%)	3 (4.2)	5 (6.9)	14 (19.4)	17 (23.6)	15 (20.8)	13 (18.1)	5 (6.9)	72 (100.0)	39	111	7.65	4.14
30歳～ (%)	9 (2.1)	17 (4.0)	55 (13.1)	131 (31.2)	132 (31.4)	56 (13.3)	20 (4.8)	420 (100.0)	281	701	7.45	2.64
45歳～ (%)	17 (1.2)	51 (3.7)	197 (14.2)	449 (32.4)	441 (31.8)	149 (10.8)	82 (5.9)	1,386 (100.0)	916	2,302	7.48	2.73
60歳～ (%)	40 (1.6)	157 (6.4)	467 (19.0)	884 (36.1)	666 (27.2)	162 (6.6)	76 (3.1)	2,452 (100.0)	1,582	4,034	6.78	2.55
75歳～ (%)	37 (3.9)	131 (13.8)	306 (32.2)	295 (31.1)	139 (14.6)	28 (2.9)	14 (1.5)	950 (100.0)	641	1,591	5.64	2.43
90歳～ (%)	6 (9.2)	16 (24.6)	22 (33.8)	14 (21.5)	6 (9.2)	1 (1.5)		65 (100.0)	40	105	4.66	2.15
合計 (%)	119 (2.2)	393 (7.3)	1,072 (19.9)	1,795 (33.3)	1,406 (26.1)	410 (7.6)	201 (3.7)	5,396 (100.0)	3,545	8,941	6.78	2.71
不明 (%)												
記載なし (%)												
総計 (%)	119 (2.2)	393 (7.3)	1,072 (19.9)	1,795 (33.3)	1,406 (26.1)	410 (7.6)	201 (3.7)	5,396 (100.0)	3,545	8,941	6.78	2.71
平均	63.82	67.15	66.10	62.87	60.17	57.12	56.67	62.47	62.41	62.45		
標準偏差	21.82	18.97	14.90	12.82	12.62	13.30	13.91	14.37	14.79	14.53		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査