

表 3950 一日透析液使用量(L/日) 現在施行中のPD歴(年)別(腹膜透析患者)

現在施行中のPD 歴	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1年未満	53	158	343	386	223	46	17	1,226	67	1,293	5.78	2.37
(%)	(4.3)	(12.9)	(28.0)	(31.5)	(18.2)	(3.8)	(1.4)	(100.0)				
1年～	18	89	228	349	221	72	22	999	52	1,051	6.49	2.43
(%)	(1.8)	(8.9)	(22.8)	(34.9)	(22.1)	(7.2)	(2.2)	(100.0)				
2年～	19	82	280	486	368	126	51	1,412	102	1,514	6.97	2.73
(%)	(1.3)	(5.8)	(19.8)	(34.4)	(26.1)	(8.9)	(3.6)	(100.0)				
4年～	14	36	120	272	266	77	47	832	36	868	7.48	3.14
(%)	(1.7)	(4.3)	(14.4)	(32.7)	(32.0)	(9.3)	(5.6)	(100.0)				
6年～	6	13	49	148	147	31	32	426	25	451	7.48	2.42
(%)	(1.4)	(3.1)	(11.5)	(34.7)	(34.5)	(7.3)	(7.5)	(100.0)				
8年～	3	4	25	67	58	26	14	197	16	213	7.58	2.54
(%)	(1.5)	(2.0)	(12.7)	(34.0)	(29.4)	(13.2)	(7.1)	(100.0)				
10年～	3	9	14	65	105	31	16	243	12	255	7.85	2.72
(%)	(1.2)	(3.7)	(5.8)	(26.7)	(43.2)	(12.8)	(6.6)	(100.0)				
合計	116	391	1,059	1,773	1,388	409	199	5,335	310	5,645	6.79	2.72
(%)	(2.2)	(7.3)	(19.9)	(33.2)	(26.0)	(7.7)	(3.7)	(100.0)				
記載なし	3	2	13	22	18	1	2	61	3,235	3,296	6.54	2.39
(%)	(4.9)	(3.3)	(21.3)	(36.1)	(29.5)	(1.6)	(3.3)	(100.0)				
総計	119	393	1,072	1,795	1,406	410	201	5,396	3,545	8,941	6.78	2.71
(%)	(2.2)	(7.3)	(19.9)	(33.3)	(26.1)	(7.6)	(3.7)	(100.0)				
平均	2.28	2.19	2.42	3.27	4.19	4.24	4.97	3.38	3.35	3.38		
標準偏差	2.77	2.68	2.31	2.97	3.83	3.55	3.47	3.25	3.16	3.24		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査