

表 3952 一日透析液使用量(L/日) 医療機関別 (腹膜透析患者)

医療機関	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	8	35	116	143	88	40	11	441	272	713	6.57	2.43
(%)	(1.8)	(7.9)	(26.3)	(32.4)	(20.0)	(9.1)	(2.5)	(100.0)				
私立大学	17	58	119	199	163	43	42	641	492	1,133	7.08	3.89
(%)	(2.7)	(9.0)	(18.6)	(31.0)	(25.4)	(6.7)	(6.6)	(100.0)				
国立	5	17	34	42	23	9	7	137	65	202	6.21	2.64
(%)	(3.6)	(12.4)	(24.8)	(30.7)	(16.8)	(6.6)	(5.1)	(100.0)				
県市町村立	19	68	174	320	227	78	36	922	664	1,586	6.83	2.48
(%)	(2.1)	(7.4)	(18.9)	(34.7)	(24.6)	(8.5)	(3.9)	(100.0)				
社会保険	4	12	52	54	45	11	4	182	305	487	6.55	2.88
(%)	(2.2)	(6.6)	(28.6)	(29.7)	(24.7)	(6.0)	(2.2)	(100.0)				
厚生連	16	18	78	133	124	31	10	410	216	626	6.75	2.40
(%)	(3.9)	(4.4)	(19.0)	(32.4)	(30.2)	(7.6)	(2.4)	(100.0)				
その他公的	10	58	149	321	232	47	20	837	482	1,319	6.71	2.42
(%)	(1.2)	(6.9)	(17.8)	(38.4)	(27.7)	(5.6)	(2.4)	(100.0)				
私立総合	4	21	93	103	80	14	4	319	58	377	6.25	2.19
(%)	(1.3)	(6.6)	(29.2)	(32.3)	(25.1)	(4.4)	(1.3)	(100.0)				
私立	20	59	158	312	270	84	29	932	757	1,689	6.89	2.45
(%)	(2.1)	(6.3)	(17.0)	(33.5)	(29.0)	(9.0)	(3.1)	(100.0)				
私立診療所	16	47	99	168	154	53	38	575	234	809	7.03	2.87
(%)	(2.8)	(8.2)	(17.2)	(29.2)	(26.8)	(9.2)	(6.6)	(100.0)				
総計	119	393	1,072	1,795	1,406	410	201	5,396	3,545	8,941	6.78	2.71
(%)	(2.2)	(7.3)	(19.9)	(33.3)	(26.1)	(7.6)	(3.7)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査