

表 3956 一日透析液使用量(L/日) 現在施行中のPD歴(年)別(腹膜透析単独患者)

現在施行中のPD 歴	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1年未満	53	156	335	371	212	45	15	1,187	65	1,252	5.75	2.37
(%)	(4.5)	(13.1)	(28.2)	(31.3)	(17.9)	(3.8)	(1.3)	(100.0)				
1年～	15	87	212	322	193	60	15	904	44	948	6.38	2.39
(%)	(1.7)	(9.6)	(23.5)	(35.6)	(21.3)	(6.6)	(1.7)	(100.0)				
2年～	16	77	264	430	287	82	39	1,195	74	1,269	6.74	2.68
(%)	(1.3)	(6.4)	(22.1)	(36.0)	(24.0)	(6.9)	(3.3)	(100.0)				
4年～	9	32	100	206	185	51	33	616	24	640	7.36	3.35
(%)	(1.5)	(5.2)	(16.2)	(33.4)	(30.0)	(8.3)	(5.4)	(100.0)				
6年～	6	10	40	90	75	15	17	253	16	269	7.11	2.47
(%)	(2.4)	(4.0)	(15.8)	(35.6)	(29.6)	(5.9)	(6.7)	(100.0)				
8年～	3	3	13	35	27	9	3	93	8	101	7.05	2.53
(%)	(3.2)	(3.2)	(14.0)	(37.6)	(29.0)	(9.7)	(3.2)	(100.0)				
10年～	1	4	9	22	47	11	7	101	8	109	7.89	3.01
(%)	(1.0)	(4.0)	(8.9)	(21.8)	(46.5)	(10.9)	(6.9)	(100.0)				
合計	103	369	973	1,476	1,026	273	129	4,349	239	4,588	6.54	2.71
(%)	(2.4)	(8.5)	(22.4)	(33.9)	(23.6)	(6.3)	(3.0)	(100.0)				
記載なし	3	2	13	17	15			50	2,550	2,600	6.02	1.99
(%)	(6.0)	(4.0)	(26.0)	(34.0)	(30.0)			(100.0)				
総計	106	371	986	1,493	1,041	273	129	4,399	2,789	7,188	6.53	2.70
(%)	(2.4)	(8.4)	(22.4)	(33.9)	(23.7)	(6.2)	(2.9)	(100.0)				
平均	1.99	1.90	2.22	2.75	3.44	3.37	4.26	2.79	2.95	2.80		
標準偏差	2.39	1.96	2.10	2.49	3.29	2.95	3.16	2.70	3.08	2.72		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査