

表 3958 一日透析液使用量(L/日) 医療機関別（腹膜透析単独患者）

医療機関	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	8	35	114	131	80	28	10	406	235	641	6.40	2.38
(%)	(2.0)	(8.6)	(28.1)	(32.3)	(19.7)	(6.9)	(2.5)	(100.0)				
私立大学	17	58	115	174	134	28	34	560	407	967	6.87	4.04
(%)	(3.0)	(10.4)	(20.5)	(31.1)	(23.9)	(5.0)	(6.1)	(100.0)				
国立	5	17	34	38	20	9	5	128	57	185	6.08	2.61
(%)	(3.9)	(13.3)	(26.6)	(29.7)	(15.6)	(7.0)	(3.9)	(100.0)				
県市町村立	19	66	160	278	178	54	20	775	545	1,320	6.54	2.36
(%)	(2.5)	(8.5)	(20.6)	(35.9)	(23.0)	(7.0)	(2.6)	(100.0)				
社会保険	3	10	51	52	33	9	3	161	277	438	6.42	2.85
(%)	(1.9)	(6.2)	(31.7)	(32.3)	(20.5)	(5.6)	(1.9)	(100.0)				
厚生連	11	17	74	106	94	18	5	325	169	494	6.48	2.24
(%)	(3.4)	(5.2)	(22.8)	(32.6)	(28.9)	(5.5)	(1.5)	(100.0)				
その他公的	9	55	142	289	180	31	15	721	368	1,089	6.53	2.43
(%)	(1.2)	(7.6)	(19.7)	(40.1)	(25.0)	(4.3)	(2.1)	(100.0)				
私立総合	4	17	72	60	50	9	1	213	41	254	5.97	2.09
(%)	(1.9)	(8.0)	(33.8)	(28.2)	(23.5)	(4.2)	(0.5)	(100.0)				
私立	19	57	142	256	188	60	20	742	560	1,302	6.64	2.47
(%)	(2.6)	(7.7)	(19.1)	(34.5)	(25.3)	(8.1)	(2.7)	(100.0)				
私立診療所	11	39	82	109	84	27	16	368	130	498	6.50	2.71
(%)	(3.0)	(10.6)	(22.3)	(29.6)	(22.8)	(7.3)	(4.3)	(100.0)				
総計	106	371	986	1,493	1,041	273	129	4,399	2,789	7,188	6.53	2.70
(%)	(2.4)	(8.4)	(22.4)	(33.9)	(23.7)	(6.2)	(2.9)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査