

表 3959 一日透析液使用量(L/日) 治療方法(新分類)別 (PD・HD(F)等併用患者)

治療方法 (新分類)	2未満	2~	4~	6~	8~	10~	12~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD)	3 (0.6)	16 (3.2)	54 (10.7)	198 (39.4)	209 (41.6)	18 (3.6)	5 (1.0)	503 (100.0)	386	889	6.97	1.78
腹膜透析 (APD)	7 (2.6)	3 (1.1)	21 (7.8)	66 (24.4)	87 (32.2)	57 (21.1)	29 (10.7)	270 (100.0)	231	501	8.56	2.76
腹膜透析 (CCPD)	3 (1.4)	3 (1.4)	11 (5.0)	38 (17.2)	69 (31.2)	60 (27.1)	37 (16.7)	221 (100.0)	137	358	9.20	2.62
合計 (%)	13 (1.3)	22 (2.2)	86 (8.7)	302 (30.4)	365 (36.7)	135 (13.6)	71 (7.1)	994 (100.0)	754	1,748	7.90	2.47
記載なし (%)												
総計 (%)	13 (1.3)	22 (2.2)	86 (8.7)	302 (30.4)	365 (36.7)	135 (13.6)	71 (7.1)	994 (100.0)	754	1,748	7.90	2.47

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

\*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査