

表 3960 一日透析液使用量(L/日) 併用の状況別 (PD・HD(F)等併用患者)

併用の状況	2未満	2~	4~	6~	8~	10~	12~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)												
PD単独 (%)												
HD(F)単独.PDカテ あり (%)												
PD.HD併用週1 HD(F) (%)	12 (1.4)	15 (1.8)	70 (8.2)	253 (29.7)	321 (37.7)	118 (13.9)	62 (7.3)	851 (100.0)	693	1,544	7.97	2.47
PD.HD併用週2 HD(F) (%)	1 (1.0)	4 (4.0)	16 (16.2)	36 (36.4)	24 (24.2)	12 (12.1)	6 (6.1)	99 (100.0)	42	141	7.26	2.54
PD.HD併用週3 HD(F) (%)												
PD.HD併用週4 HD(F) (%)												
PD.HD併用その他 (%)		3 (6.8)		13 (29.5)	20 (45.5)	5 (11.4)	3 (6.8)	44 (100.0)	19	63	7.88	2.19
合計 (%)	13 (1.3)	22 (2.2)	86 (8.7)	302 (30.4)	365 (36.7)	135 (13.6)	71 (7.1)	994 (100.0)	754	1,748	7.90	2.47
不明 (%)												
記載なし (%)												
総計 (%)	13 (1.3)	22 (2.2)	86 (8.7)	302 (30.4)	365 (36.7)	135 (13.6)	71 (7.1)	994 (100.0)	754	1,748	7.90	2.47

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査