

表 3962 一日透析液使用量(L/日) 年齢(歳)別 (PD・HD(F)等併用患者)

年齢	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)												
15歳～ (%)				2 (20.0)	2 (20.0)	4 (40.0)	2 (20.0)	10 (100.0)	9	19	10.19	3.55
30歳～ (%)	2 (2.1)		6 (6.3)	23 (24.0)	39 (40.6)	18 (18.8)	8 (8.3)	96 (100.0)	80	176	8.29	2.38
45歳～ (%)	5 (1.5)	4 (1.2)	15 (4.5)	94 (28.0)	131 (39.0)	55 (16.4)	32 (9.5)	336 (100.0)	285	621	8.35	2.50
60歳～ (%)	5 (1.1)	13 (2.8)	47 (10.2)	151 (32.9)	163 (35.5)	55 (12.0)	25 (5.4)	459 (100.0)	340	799	7.63	2.33
75歳～ (%)		5 (5.5)	18 (19.8)	32 (35.2)	29 (31.9)	3 (3.3)	4 (4.4)	91 (100.0)	39	130	7.00	2.47
90歳～ (%)	1 (50.0)				1 (50.0)			2 (100.0)	1	3	4.50	4.95
合計 (%)	13 (1.3)	22 (2.2)	86 (8.7)	302 (30.4)	365 (36.7)	135 (13.6)	71 (7.1)	994 (100.0)	754	1,748	7.90	2.47
不明 (%)												
記載なし (%)												
総計 (%)	13 (1.3)	22 (2.2)	86 (8.7)	302 (30.4)	365 (36.7)	135 (13.6)	71 (7.1)	994 (100.0)	754	1,748	7.90	2.47
平均	58.85	67.14	64.62	60.92	59.10	56.44	56.37	59.75	58.33	59.14		
標準偏差	13.90	10.34	11.34	11.02	11.32	11.89	12.28	11.63	11.47	11.58		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査