

表 3963 一日透析液使用量(L/日) 現在施行中のPD歴(年)別 (PD・HD(F)等併用患者)

現在施行中のPD 歴	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1年未満 (%)		2 (5.1)	8 (20.5)	15 (38.5)	11 (28.2)	1 (2.6)	2 (5.1)	39 (100.0)	2	41	6.81	2.23
1年～ (%)	3 (3.2)	2 (2.1)	16 (17.0)	27 (28.7)	28 (29.8)	11 (11.7)	7 (7.4)	94 (100.0)	8	102	7.45	2.55
2年～ (%)	3 (1.4)	5 (2.3)	16 (7.4)	56 (25.9)	81 (37.5)	43 (19.9)	12 (5.6)	216 (100.0)	28	244	8.22	2.62
4年～ (%)	5 (2.3)	4 (1.9)	20 (9.3)	66 (30.6)	81 (37.5)	26 (12.0)	14 (6.5)	216 (100.0)	12	228	7.81	2.45
6年～ (%)		3 (1.7)	9 (5.2)	58 (33.5)	72 (41.6)	16 (9.2)	15 (8.7)	173 (100.0)	9	182	8.03	2.23
8年～ (%)		1 (1.0)	12 (11.5)	32 (30.8)	31 (29.8)	17 (16.3)	11 (10.6)	104 (100.0)	8	112	8.05	2.48
10年～ (%)	2 (1.4)	5 (3.5)	5 (3.5)	43 (30.5)	58 (41.1)	20 (14.2)	8 (5.7)	141 (100.0)	4	145	7.79	2.47
合計 (%)	13 (1.3)	22 (2.2)	86 (8.7)	297 (30.2)	362 (36.8)	134 (13.6)	69 (7.0)	983 (100.0)	71	1,054	7.88	2.47
記載なし (%)				5 (45.5)	3 (27.3)	1 (9.1)	2 (18.2)	11 (100.0)	683	694	8.87	2.77
総計 (%)	13 (1.3)	22 (2.2)	86 (8.7)	302 (30.4)	365 (36.7)	135 (13.6)	71 (7.1)	994 (100.0)	754	1,748	7.90	2.47
平均	4.65	6.98	4.65	5.89	6.33	6.04	6.17	5.99	4.70	5.90		
標準偏差	4.25	6.34	3.27	3.68	4.41	3.99	3.56	4.06	3.09	4.02		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査