

表 3964 一日透析液使用量(L/日) 原疾患別 (PD・HD(F)等併用患者)

原疾患	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	5 (1.1)	9 (2.0)	25 (5.5)	135 (29.9)	179 (39.6)	67 (14.8)	32 (7.1)	452 (100.0)	275	727	8.07	2.42
慢性腎盂腎炎 (%)	1 (9.1)			2 (18.2)	4 (36.4)	3 (27.3)	1 (9.1)	11 (100.0)	3	14	8.30	3.14
急速進行性糸球 体腎炎 (%)				4 (66.7)	2 (33.3)			6 (100.0)	4	10	6.97	0.90
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)			2 (28.6)	4 (57.1)		1 (14.3)		7 (100.0)	3	10	6.23	2.02
その他の分類不能 の腎炎 (%)			2 (18.2)	2 (18.2)	3 (27.3)	2 (18.2)	2 (18.2)	11 (100.0)	8	19	8.82	2.81
多発性嚢胞腎 (%)			3 (13.0)	9 (39.1)	7 (30.4)	2 (8.7)	2 (8.7)	23 (100.0)	14	37	7.63	2.21
腎硬化症 (%)		2 (2.6)	6 (7.7)	28 (35.9)	28 (35.9)	9 (11.5)	5 (6.4)	78 (100.0)	65	143	7.94	2.24
悪性高血圧 (%)		1 (6.7)	2 (13.3)	5 (33.3)	5 (33.3)	1 (6.7)	1 (6.7)	15 (100.0)	7	22	7.25	2.28
糖尿病性腎症 (%)	3 (1.1)	9 (3.3)	36 (13.2)	79 (28.9)	94 (34.4)	34 (12.5)	18 (6.6)	273 (100.0)	257	530	7.65	2.44
SLE腎炎 (%)				3 (75.0)			1 (25.0)	4 (100.0)	4	8	9.13	6.25
アミロイド腎 (%)						1 (100.0)		1 (100.0)	1	2	11.00	
痛風腎 (%)				2 (33.3)	3 (50.0)		1 (16.7)	6 (100.0)	1	7	8.42	2.11
先天性代謝異常に よる腎不全 (%)					1 (100.0)			1 (100.0)		1	9.00	
腎・尿路結核 (%)												
腎・尿路結石 (%)					1 (100.0)			1 (100.0)	1	2	9.00	
腎・尿路腫瘍 (%)					2 (100.0)			2 (100.0)	1	3	8.00	
閉塞性尿路障害 (%)							1 (100.0)	1 (100.0)	2	3	12.00	
骨髄腫 (%)									1	1		
腎形成不全 (%)					1 (50.0)		1 (50.0)	2 (100.0)	2	4	10.25	3.18
不明 (%)	1 (1.4)		8 (11.4)	23 (32.9)	26 (37.1)	7 (10.0)	5 (7.1)	70 (100.0)	80	150	7.77	2.67
再導入 (%)				3 (33.3)	2 (22.2)	4 (44.4)		9 (100.0)	6	15	8.49	1.94
その他 (%)	3 (14.3)	1 (4.8)	2 (9.5)	3 (14.3)	7 (33.3)	4 (19.0)	1 (4.8)	21 (100.0)	19	40	7.09	3.36
合計 (%)	13 (1.3)	22 (2.2)	86 (8.7)	302 (30.4)	365 (36.7)	135 (13.6)	71 (7.1)	994 (100.0)	754	1,748	7.90	2.47
記載なし (%)												
総計 (%)	13 (1.3)	22 (2.2)	86 (8.7)	302 (30.4)	365 (36.7)	135 (13.6)	71 (7.1)	994 (100.0)	754	1,748	7.90	2.47

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査