

表 3965 一日透析液使用量(L/日) 医療機関別 (PD・HD(F)等併用患者)

医療機関	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学			2	12	8	11	1	34	35	69	8.49	2.16
(%)			(5.9)	(35.3)	(23.5)	(32.4)	(2.9)	(100.0)				
私立大学			4	25	29	15	8	81	85	166	8.52	2.19
(%)			(4.9)	(30.9)	(35.8)	(18.5)	(9.9)	(100.0)				
国立				4	3		2	9	8	17	8.11	2.37
(%)				(44.4)	(33.3)		(22.2)	(100.0)				
県市町村立		2	14	42	49	24	16	147	119	266	8.31	2.55
(%)		(1.4)	(9.5)	(28.6)	(33.3)	(16.3)	(10.9)	(100.0)				
社会保険	1	2	1	2	12	2	1	21	28	49	7.55	2.92
(%)	(4.8)	(9.5)	(4.8)	(9.5)	(57.1)	(9.5)	(4.8)	(100.0)				
厚生連	5	1	4	27	30	13	5	85	47	132	7.80	2.71
(%)	(5.9)	(1.2)	(4.7)	(31.8)	(35.3)	(15.3)	(5.9)	(100.0)				
その他公的	1	3	7	32	52	16	5	116	114	230	7.85	2.01
(%)	(0.9)	(2.6)	(6.0)	(27.6)	(44.8)	(13.8)	(4.3)	(100.0)				
私立総合		4	21	43	30	5	2	105	17	122	6.74	2.21
(%)		(3.8)	(20.0)	(41.0)	(28.6)	(4.8)	(1.9)	(100.0)				
私立	1	2	16	56	82	23	9	189	197	386	7.88	2.09
(%)	(0.5)	(1.1)	(8.5)	(29.6)	(43.4)	(12.2)	(4.8)	(100.0)				
私立診療所	5	8	17	59	70	26	22	207	104	311	7.96	2.92
(%)	(2.4)	(3.9)	(8.2)	(28.5)	(33.8)	(12.6)	(10.6)	(100.0)				
総計	13	22	86	302	365	135	71	994	754	1,748	7.90	2.47
(%)	(1.3)	(2.2)	(8.7)	(30.4)	(36.7)	(13.6)	(7.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査