

表 3966 残存腎機能(一日尿量)(mL/日) 治療方法(新分類)別(腹膜透析患者)

治療方法 (新分類)	100未満	100~	400~	800~	1200~	1600~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD)	476	432	563	490	292	181	2,434	2,587	5,021	667.43	586.95
(%)	(19.6)	(17.7)	(23.1)	(20.1)	(12.0)	(7.4)	(100.0)				
腹膜透析 (APD)	264	240	345	307	211	107	1,474	1,365	2,839	705.59	581.97
(%)	(17.9)	(16.3)	(23.4)	(20.8)	(14.3)	(7.3)	(100.0)				
腹膜透析 (CCPD)	212	137	115	102	36	19	621	460	1,081	432.31	481.84
(%)	(34.1)	(22.1)	(18.5)	(16.4)	(5.8)	(3.1)	(100.0)				
合計	952	809	1,023	899	539	307	4,529	4,412	8,941	647.61	578.57
(%)	(21.0)	(17.9)	(22.6)	(19.8)	(11.9)	(6.8)	(100.0)				
記載なし (%)											
総計	952	809	1,023	899	539	307	4,529	4,412	8,941	647.61	578.57
(%)	(21.0)	(17.9)	(22.6)	(19.8)	(11.9)	(6.8)	(100.0)				

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

\*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査