

表 3967 残存腎機能(一日尿量)(mL/日) 併用の状況別 (腹膜透析患者)

併用の状況	100未満	100～	400～	800～	1200～	1600～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)											
PD単独 (%)	485 (13.0)	620 (16.6)	948 (25.4)	855 (22.9)	530 (14.2)	301 (8.1)	3,739 (100.0)	3,449	7,188	746.14	572.62
HD(F)単独,PDカテ あり (%)											
PD,HD併用週1 HD(F) (%)	408 (58.0)	175 (24.9)	65 (9.2)	41 (5.8)	8 (1.1)	6 (0.9)	703 (100.0)	841	1,544	186.32	327.93
PD,HD併用週2 HD(F) (%)	36 (76.6)	5 (10.6)	5 (10.6)	1 (2.1)			47 (100.0)	94	141	96.17	207.65
PD,HD併用週3 HD(F) (%)											
PD,HD併用週4 HD(F) (%)											
PD,HD併用その他 (%)	20 (54.1)	9 (24.3)	5 (13.5)	2 (5.4)	1 (2.7)		37 (100.0)	26	63	208.14	333.02
合計 (%)	949 (21.0)	809 (17.9)	1,023 (22.6)	899 (19.9)	539 (11.9)	307 (6.8)	4,526 (100.0)	4,410	8,936	648.04	578.52
不明 (%)	3 (100.0)						3 (100.0)	2	5		
記載なし (%)											
総計 (%)	952 (21.0)	809 (17.9)	1,023 (22.6)	899 (19.8)	539 (11.9)	307 (6.8)	4,529 (100.0)	4,412	8,941	647.61	578.57

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査