

表 3969 残存腎機能(一日尿量)(mL/日) 年齢(歳)別(腹膜透析患者)

年齢	100未満	100～	400～	800～	1200～	1600～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満	21	8	10	2	2	1	44	53	97	301.34	440.31
(%)	(47.7)	(18.2)	(22.7)	(4.5)	(4.5)	(2.3)	(100.0)				
15歳～	17	8	14	11	5	4	59	52	111	605.17	601.15
(%)	(28.8)	(13.6)	(23.7)	(18.6)	(8.5)	(6.8)	(100.0)				
30歳～	99	51	68	60	43	27	348	353	701	616.11	613.05
(%)	(28.4)	(14.7)	(19.5)	(17.2)	(12.4)	(7.8)	(100.0)				
45歳～	290	234	201	224	143	97	1,189	1,113	2,302	649.11	637.82
(%)	(24.4)	(19.7)	(16.9)	(18.8)	(12.0)	(8.2)	(100.0)				
60歳～	409	352	473	418	259	141	2,052	1,982	4,034	663.46	567.92
(%)	(19.9)	(17.2)	(23.1)	(20.4)	(12.6)	(6.9)	(100.0)				
75歳～	110	144	244	177	80	37	792	799	1,591	645.21	497.44
(%)	(13.9)	(18.2)	(30.8)	(22.3)	(10.1)	(4.7)	(100.0)				
90歳～	6	12	13	7	7		45	60	105	565.67	450.01
(%)	(13.3)	(26.7)	(28.9)	(15.6)	(15.6)		(100.0)				
合計	952	809	1,023	899	539	307	4,529	4,412	8,941	647.61	578.57
(%)	(21.0)	(17.9)	(22.6)	(19.8)	(11.9)	(6.8)	(100.0)				
不明											
(%)											
記載なし											
(%)											
総計	952	809	1,023	899	539	307	4,529	4,412	8,941	647.61	578.57
(%)	(21.0)	(17.9)	(22.6)	(19.8)	(11.9)	(6.8)	(100.0)				
平均	58.86	62.93	64.46	63.53	62.62	60.51	62.34	62.56	62.45		
標準偏差	15.36	14.15	14.75	13.35	12.89	13.01	14.32	14.75	14.53		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査