

表 3979 残存腎機能(一日尿量)(mL/日) 治療方法(新分類)別 (PD・HD(F)等併用患者)

治療方法 (新分類)	100未満	100～	400～	800～	1200～	1600～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD)	231	83	34	19	5	2	374	515	889	166.21	307.23
(%)	(61.8)	(22.2)	(9.1)	(5.1)	(1.3)	(0.5)	(100.0)				
腹膜透析 (APD)	117	57	31	16	4	3	228	273	501	242.05	374.66
(%)	(51.3)	(25.0)	(13.6)	(7.0)	(1.8)	(1.3)	(100.0)				
腹膜透析 (CCPD)	116	49	10	9		1	185	173	358	139.75	271.20
(%)	(62.7)	(26.5)	(5.4)	(4.9)		(0.5)	(100.0)				
合計	464	189	75	44	9	6	787	961	1,748	181.96	322.70
(%)	(59.0)	(24.0)	(9.5)	(5.6)	(1.1)	(0.8)	(100.0)				
記載なし (%)											
総計	464	189	75	44	9	6	787	961	1,748	181.96	322.70
(%)	(59.0)	(24.0)	(9.5)	(5.6)	(1.1)	(0.8)	(100.0)				

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

\*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査