

表 3986 一日平均除水量(mL/日) 治療方法(新分類)別(腹膜透析患者)

治療方法 (新分類)	−1000未満	−1000～	0～	1000～	2000～	3000～	4000～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)	2 (0.1)	134 (5.2)	1,737 (67.7)	662 (25.8)	26 (1.0)	5 (0.2)		2,566 (100.0)	2,455	5,021	662.73	521.32
腹膜透析 (APD) (%)		61 (3.8)	1,131 (70.6)	387 (24.1)	20 (1.2)	2 (0.1)	2 (0.1)	1,603 (100.0)	1,236	2,839	642.88	502.76
腹膜透析 (CCPD) (%)	2 (0.3)	14 (2.2)	391 (60.4)	229 (35.4)	11 (1.7)			647 (100.0)	434	1,081	798.91	479.57
合計 (%)	4 (0.1)	209 (4.3)	3,259 (67.7)	1,278 (26.5)	57 (1.2)	7 (0.1)	2 (0.0)	4,816 (100.0)	4,125	8,941	674.42	512.07
記載なし (%)												
総計 (%)	4 (0.1)	209 (4.3)	3,259 (67.7)	1,278 (26.5)	57 (1.2)	7 (0.1)	2 (0.0)	4,816 (100.0)	4,125	8,941	674.42	512.07

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査