

表 3993 一日平均除水量(mL/日) 治療方法(新分類)別 (腹膜透析単独患者)

治療方法 (新分類)	−1000未満	−1000～	0～	1000～	2000～	3000～	4000～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)	2 (0.1)	126 (5.9)	1,521 (70.9)	472 (22.0)	19 (0.9)	4 (0.2)		2,144 (100.0)	1,988	4,132	610.39	512.55
腹膜透析 (APD) (%)		60 (4.4)	1,009 (74.3)	274 (20.2)	13 (1.0)		2 (0.1)	1,358 (100.0)	978	2,336	590.90	485.12
腹膜透析 (CCPD) (%)		12 (2.7)	300 (67.1)	130 (29.1)	5 (1.1)			447 (100.0)	273	720	726.45	455.32
合計 (%)	2 (0.1)	198 (5.0)	2,830 (71.7)	876 (22.2)	37 (0.9)	4 (0.1)	2 (0.1)	3,949 (100.0)	3,239	7,188	616.83	498.52
記載なし (%)												
総計 (%)	2 (0.1)	198 (5.0)	2,830 (71.7)	876 (22.2)	37 (0.9)	4 (0.1)	2 (0.1)	3,949 (100.0)	3,239	7,188	616.83	498.52

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査