

表 3999 一日平均除水量(mL/日) 治療方法(新分類)別 (PD・HD(F)等併用患者)

治療方法 (新分類)	−1000未満	−1000～	0～	1000～	2000～	3000～	4000～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)		8 (1.9)	216 (51.2)	190 (45.0)	7 (1.7)	1 (0.2)		422 (100.0)	467	889	928.63	483.45
腹膜透析 (APD) (%)		1 (0.4)	121 (49.8)	112 (46.1)	7 (2.9)	2 (0.8)		243 (100.0)	258	501	931.66	503.36
腹膜透析 (CCPD) (%)	2 (1.0)	2 (1.0)	91 (45.7)	98 (49.2)	6 (3.0)			199 (100.0)	159	358	957.15	492.18
合計 (%)	2 (0.2)	11 (1.3)	428 (49.5)	400 (46.3)	20 (2.3)	3 (0.3)		864 (100.0)	884	1,748	936.05	490.69
記載なし (%)												
総計 (%)	2 (0.2)	11 (1.3)	428 (49.5)	400 (46.3)	20 (2.3)	3 (0.3)		864 (100.0)	884	1,748	936.05	490.69

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査