

表 4009 APD使用の有無 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	1 (2.0)	49 (98.0)	50 (100.0)		47	97
15歳～ (%)	22 (28.9)	54 (71.1)	76 (100.0)	1	34	111
30歳～ (%)	195 (46.1)	228 (53.9)	423 (100.0)	3	275	701
45歳～ (%)	675 (48.2)	726 (51.8)	1,401 (100.0)	9	892	2,302
60歳～ (%)	1,418 (57.1)	1,066 (42.9)	2,484 (100.0)	17	1,533	4,034
75歳～ (%)	601 (62.2)	366 (37.8)	967 (100.0)	5	619	1,591
90歳～ (%)	44 (67.7)	21 (32.3)	65 (100.0)		40	105
合計 (%)	2,956 (54.1)	2,510 (45.9)	5,466 (100.0)	35	3,440	8,941
不明 (%)						
記載なし (%)						
総計 (%)	2,956 (54.1)	2,510 (45.9)	5,466 (100.0)	35	3,440	8,941
平均	64.58	60.03	62.49	60.23	62.40	62.45
標準偏差	12.87	15.59	14.36	12.12	14.82	14.53

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査