

表 4010 APD使用の有無 現在施行中のPD歴(年)別（腹膜透析患者）

現在施行中のPD 歴	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
1年未満 (%)	646 (52.6)	581 (47.4)	1,227 (100.0)	3	63	1,293
1年～ (%)	490 (49.1)	508 (50.9)	998 (100.0)	3	50	1,051
2年～ (%)	769 (53.9)	659 (46.1)	1,428 (100.0)	16	70	1,514
4年～ (%)	434 (52.5)	392 (47.5)	826 (100.0)	9	33	868
6年～ (%)	264 (61.7)	164 (38.3)	428 (100.0)		23	451
8年～ (%)	131 (64.9)	71 (35.1)	202 (100.0)	4	7	213
10年～ (%)	165 (66.8)	82 (33.2)	247 (100.0)		8	255
合計 (%)	2,899 (54.1)	2,457 (45.9)	5,356 (100.0)	35	254	5,645
記載なし (%)	57 (51.8)	53 (48.2)	110 (100.0)		3,186	3,296
総計 (%)	2,956 (54.1)	2,510 (45.9)	5,466 (100.0)	35	3,440	8,941
平均	3.63	3.11	3.39	3.72	3.12	3.38
標準偏差	3.48	2.93	3.25	2.31	3.21	3.24

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査