

表 4015 APD使用の有無 年齢(歳)別 (腹膜透析単独患者)

年齢	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	1 (2.0)	49 (98.0)	50 (100.0)		47	97
15歳～ (%)	19 (28.8)	47 (71.2)	66 (100.0)	1	25	92
30歳～ (%)	150 (46.9)	170 (53.1)	320 (100.0)	3	202	525
45歳～ (%)	515 (49.0)	536 (51.0)	1,051 (100.0)	7	621	1,679
60歳～ (%)	1,163 (57.6)	857 (42.4)	2,020 (100.0)	14	1,199	3,233
75歳～ (%)	548 (62.5)	329 (37.5)	877 (100.0)	5	578	1,460
90歳～ (%)	42 (67.7)	20 (32.3)	62 (100.0)		40	102
合計 (%)	2,438 (54.8)	2,008 (45.2)	4,446 (100.0)	30	2,712	7,188
不明 (%)						
記載なし (%)						
総計 (%)	2,438 (54.8)	2,008 (45.2)	4,446 (100.0)	30	2,712	7,188
平均	65.42	60.41	63.16	59.80	63.44	63.25
標準偏差	12.99	16.36	14.82	12.96	15.47	15.06

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査