

表 4022 APD使用の有無 年齢(歳)別 (PD・HD(F)等併用患者)

年齢	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)						
15歳～ (%)	3 (30.0)	7 (70.0)	10 (100.0)		9	19
30歳～ (%)	45 (43.7)	58 (56.3)	103 (100.0)		73	176
45歳～ (%)	160 (45.8)	189 (54.2)	349 (100.0)	2	270	621
60歳～ (%)	255 (55.1)	208 (44.9)	463 (100.0)	3	333	799
75歳～ (%)	53 (59.6)	36 (40.4)	89 (100.0)		41	130
90歳～ (%)	2 (66.7)	1 (33.3)	3 (100.0)			3
合計 (%)	518 (50.9)	499 (49.1)	1,017 (100.0)	5	726	1,748
不明 (%)						
記載なし (%)						
総計 (%)	518 (50.9)	499 (49.1)	1,017 (100.0)	5	726	1,748
平均	60.64	58.42	59.55	62.80	58.53	59.14
標準偏差	11.52	11.88	11.74	4.60	11.36	11.58

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査