

表 4026 1日のPD実施時間(時間/日) 治療方法(新分類)別(腹膜透析患者)

治療方法 (新分類)	1~	5~	9~	13~	18~	24	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)	83 (2.9)	92 (3.2)	221 (7.7)	246 (8.6)	96 (3.4)	2,117 (74.2)	2,855 (100.0)	2,166	5,021	20.93	5.75
腹膜透析 (APD) (%)	13 (0.8)	667 (39.2)	390 (22.9)	68 (4.0)	45 (2.6)	519 (30.5)	1,702 (100.0)	1,137	2,839	13.71	7.23
腹膜透析 (CCPD) (%)	2 (0.3)	73 (10.5)	90 (13.0)	89 (12.8)	72 (10.4)	368 (53.0)	694 (100.0)	387	1,081	18.80	6.35
合計 (%)	98 (1.9)	832 (15.8)	701 (13.3)	403 (7.7)	213 (4.1)	3,004 (57.2)	5,251 (100.0)	3,690	8,941	18.31	7.13
記載なし (%)											
総計 (%)	98 (1.9)	832 (15.8)	701 (13.3)	403 (7.7)	213 (4.1)	3,004 (57.2)	5,251 (100.0)	3,690	8,941	18.31	7.13

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査