

表 4027 1日のPD実施時間(時間/日) 併用の状況別(腹膜透析患者)

併用の状況	1～	5～	9～	13～	18～	24	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)											
PD単独 (%)	79 (1.8)	733 (17.1)	613 (14.3)	340 (7.9)	148 (3.5)	2,370 (55.3)	4,283 (100.0)	2,905	7,188	17.99	7.21
HD(F)単独,PDカテ あり (%)											
PD,HD併用週1 HD(F) (%)	19 (2.3)	89 (10.8)	73 (8.8)	52 (6.3)	58 (7.0)	536 (64.8)	827 (100.0)	717	1,544	19.63	6.68
PD,HD併用週2 HD(F) (%)		8 (8.4)	12 (12.6)	10 (10.5)	6 (6.3)	59 (62.1)	95 (100.0)	46	141	19.55	6.27
PD,HD併用週3 HD(F) (%)											
PD,HD併用週4 HD(F) (%)											
PD,HD併用その他 (%)		1 (2.3)	3 (7.0)	1 (2.3)	1 (2.3)	37 (86.0)	43 (100.0)	20	63	22.44	4.29
合計 (%)	98 (1.9)	831 (15.8)	701 (13.4)	403 (7.7)	213 (4.1)	3,002 (57.2)	5,248 (100.0)	3,688	8,936	18.31	7.13
不明 (%)		1 (33.3)				2 (66.7)	3 (100.0)	2	5	18.67	9.24
記載なし (%)											
総計 (%)	98 (1.9)	832 (15.8)	701 (13.3)	403 (7.7)	213 (4.1)	3,004 (57.2)	5,251 (100.0)	3,690	8,941	18.31	7.13

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査