

表 4033 1日のPD実施時間(時間/日) 治療方法(新分類)別(腹膜透析単独患者)

治療方法 (新分類)	1~	5~	9~	13~	18~	24	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)	68 (2.9)	83 (3.5)	209 (8.8)	224 (9.5)	78 (3.3)	1,705 (72.0)	2,367 (100.0)	1,765	4,132	20.68	5.88
腹膜透析 (APD) (%)	11 (0.8)	594 (41.3)	338 (23.5)	50 (3.5)	30 (2.1)	414 (28.8)	1,437 (100.0)	899	2,336	13.37	7.13
腹膜透析 (CCPD) (%)		56 (11.7)	66 (13.8)	66 (13.8)	40 (8.4)	251 (52.4)	479 (100.0)	241	720	18.56	6.43
合計 (%)	79 (1.8)	733 (17.1)	613 (14.3)	340 (7.9)	148 (3.5)	2,370 (55.3)	4,283 (100.0)	2,905	7,188	17.99	7.21
記載なし (%)											
総計 (%)	79 (1.8)	733 (17.1)	613 (14.3)	340 (7.9)	148 (3.5)	2,370 (55.3)	4,283 (100.0)	2,905	7,188	17.99	7.21

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査