

表 4039 1日のPD実施時間(時間/日) 治療方法(新分類)別 (PD・HD(F)等併用患者)

治療方法 (新分類)	1~	5~	9~	13~	18~	24	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)	15 (3.1)	9 (1.8)	12 (2.5)	22 (4.5)	18 (3.7)	412 (84.4)	488 (100.0)	401	889	22.17	4.89
腹膜透析 (APD) (%)	2 (0.8)	72 (27.4)	52 (19.8)	18 (6.8)	15 (5.7)	104 (39.5)	263 (100.0)	238	501	15.58	7.43
腹膜透析 (CCPD) (%)	2 (0.9)	17 (7.9)	24 (11.2)	23 (10.7)	32 (15.0)	116 (54.2)	214 (100.0)	144	358	19.32	6.16
合計 (%)	19 (2.0)	98 (10.2)	88 (9.1)	63 (6.5)	65 (6.7)	632 (65.5)	965 (100.0)	783	1,748	19.74	6.58
記載なし (%)											
総計 (%)	19 (2.0)	98 (10.2)	88 (9.1)	63 (6.5)	65 (6.7)	632 (65.5)	965 (100.0)	783	1,748	19.74	6.58

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査