

表 4046 PD透析液交換方法 治療方法(新分類)別(腹膜透析患者)

治療方法 (新分類)	完全手動式	バッグ交換デバイス(紫 外線)	バッグ交換デバイス(熱 式無菌接合装置)	バッグ交換デバイス (左記以外、半手動も 含む)	合計	不明	記載なし	総計
腹膜透析 (CAPD) (%)	1,113 (37.6)	1,497 (50.6)	326 (11.0)	24 (0.8)	2,960 (100.0)	55	2,006	5,021
腹膜透析 (APD) (%)	418 (23.8)	998 (56.9)	303 (17.3)	36 (2.1)	1,755 (100.0)	40	1,044	2,839
腹膜透析 (CCPD) (%)	229 (31.9)	380 (53.0)	88 (12.3)	20 (2.8)	717 (100.0)	12	352	1,081
合計 (%)	1,760 (32.4)	2,875 (52.9)	717 (13.2)	80 (1.5)	5,432 (100.0)	107	3,402	8,941
記載なし (%)								
総計 (%)	1,760 (32.4)	2,875 (52.9)	717 (13.2)	80 (1.5)	5,432 (100.0)	107	3,402	8,941

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査