

表 4053 PD透析液交換方法 治療方法(新分類)別(腹膜透析単独患者)

治療方法 (新分類)	完全手動式	バッグ交換デバイス(紫 外線)	バッグ交換デバイス(熱 式無菌接合装置)	バッグ交換デバイス (左記以外、半手動も 含む)	合計	不明	記載なし	総計
腹膜透析 (CAPD) (%)	914 (37.4)	1,240 (50.8)	271 (11.1)	18 (0.7)	2,443 (100.0)	43	1,646	4,132
腹膜透析 (APD) (%)	364 (24.7)	811 (54.9)	267 (18.1)	34 (2.3)	1,476 (100.0)	27	833	2,336
腹膜透析 (CCPD) (%)	144 (28.9)	271 (54.4)	69 (13.9)	14 (2.8)	498 (100.0)	6	216	720
合計 (%)	1,422 (32.2)	2,322 (52.6)	607 (13.7)	66 (1.5)	4,417 (100.0)	76	2,695	7,188
記載なし (%)								
総計 (%)	1,422 (32.2)	2,322 (52.6)	607 (13.7)	66 (1.5)	4,417 (100.0)	76	2,695	7,188

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査