

表 4055 PD透析液交換方法 年齢(歳)別 (腹膜透析単独患者)

年齢	完全手動式	バッグ交換デバイス(紫外線)	バッグ交換デバイス(熱式無菌接合装置)	バッグ交換デバイス(左記以外、半手動も含む)	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	12 (23.5)	30 (58.8)	9 (17.6)		51 (100.0)		46	97
15歳～ (%)	18 (28.1)	33 (51.6)	12 (18.8)	1 (1.6)	64 (100.0)		28	92
30歳～ (%)	117 (36.8)	146 (45.9)	52 (16.4)	3 (0.9)	318 (100.0)	5	202	525
45歳～ (%)	360 (34.4)	529 (50.5)	144 (13.7)	15 (1.4)	1,048 (100.0)	19	612	1,679
60歳～ (%)	662 (33.0)	1,056 (52.6)	263 (13.1)	26 (1.3)	2,007 (100.0)	37	1,189	3,233
75歳～ (%)	239 (27.5)	489 (56.3)	121 (13.9)	19 (2.2)	868 (100.0)	15	577	1,460
90歳～ (%)	14 (23.0)	39 (63.9)	6 (9.8)	2 (3.3)	61 (100.0)		41	102
合計 (%)	1,422 (32.2)	2,322 (52.6)	607 (13.7)	66 (1.5)	4,417 (100.0)	76	2,695	7,188
不明 (%)								
記載なし (%)								
総計 (%)	1,422 (32.2)	2,322 (52.6)	607 (13.7)	66 (1.5)	4,417 (100.0)	76	2,695	7,188
平均	62.31	63.72	62.51	66.29	63.14	63.59	63.43	63.25
標準偏差	14.13	14.95	15.81	14.14	14.82	11.70	15.53	15.06

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査