

表 4059 PD透析液交換方法 治療方法(新分類)別 (PD・HD(F)等併用患者)

治療方法 (新分類)	完全手動式	バッグ交換デバイス(紫 外線)	バッグ交換デバイス(熱 式無菌接合装置)	バッグ交換デバイス (左記以外、半手動も 含む)	合計	不明	記載なし	総計
腹膜透析 (CAPD)	199	257	55	6	517	12	360	889
(%)	(38.5)	(49.7)	(10.6)	(1.2)	(100.0)			
腹膜透析 (APD)	54	185	36	2	277	13	211	501
(%)	(19.5)	(66.8)	(13.0)	(0.7)	(100.0)			
腹膜透析 (CCPD)	85	108	19	6	218	6	134	358
(%)	(39.0)	(49.5)	(8.7)	(2.8)	(100.0)			
合計	338	550	110	14	1,012	31	705	1,748
(%)	(33.4)	(54.3)	(10.9)	(1.4)	(100.0)			
記載なし (%)								
総計	338	550	110	14	1,012	31	705	1,748
(%)	(33.4)	(54.3)	(10.9)	(1.4)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査