

表 4062 PD透析液交換方法 年齢(歳)別 (PD・HD(F)等併用患者)

年齢	完全手動式	バッグ交換デバイス(紫外線)	バッグ交換デバイス(熱式無菌接合装置)	バッグ交換デバイス (左記以外、半手動も含む)	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)								
15歳～ (%)	5 (50.0)	5 (50.0)			10 (100.0)		9	19
30歳～ (%)	41 (39.4)	52 (50.0)	10 (9.6)	1 (1.0)	104 (100.0)	1	71	176
45歳～ (%)	119 (34.5)	190 (55.1)	29 (8.4)	7 (2.0)	345 (100.0)	12	264	621
60歳～ (%)	146 (31.9)	246 (53.8)	60 (13.1)	5 (1.1)	457 (100.0)	18	324	799
75歳～ (%)	27 (29.0)	55 (59.1)	10 (10.8)	1 (1.1)	93 (100.0)		37	130
90歳～ (%)		2 (66.7)	1 (33.3)		3 (100.0)			3
合計 (%)	338 (33.4)	550 (54.3)	110 (10.9)	14 (1.4)	1,012 (100.0)	31	705	1,748
不明 (%)								
記載なし (%)								
総計 (%)	338 (33.4)	550 (54.3)	110 (10.9)	14 (1.4)	1,012 (100.0)	31	705	1,748
平均	58.44	59.89	61.27	60.00	59.56	61.97	58.40	59.14
標準偏差	12.06	11.76	11.39	10.07	11.82	7.93	11.33	11.58

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査