

表 4067 2014年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年) 併用の状況別(腹膜透析患者)

併用の状況	0	1.0~	2.0~	3.0~	4.0~	5.0~	合計	不明 記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)											
PD単独 (%)	3,758 (87.4)	400 (9.3)	82 (1.9)	25 (0.6)	13 (0.3)	23 (0.5)	4,301 (100.0)	2,887 (100.0)	7,188 (100.0)	0.21	0.79
HD(F)単独.PDカテ あり (%)											
PD.HD併用週1 HD(F) (%)	763 (90.0)	67 (7.9)	9 (1.1)	5 (0.6)	2 (0.2)	2 (0.2)	848 (100.0)	696 (100.0)	1,544 (100.0)	0.15	0.57
PD.HD併用週2 HD(F) (%)	89 (86.4)	12 (11.7)	2 (1.9)				103 (100.0)	38 (100.0)	141 (100.0)	0.16	0.41
PD.HD併用週3 HD(F) (%)											
PD.HD併用週4 HD(F) (%)											
PD.HD併用その他 (%)	38 (82.6)	6 (13.0)	2 (4.3)				46 (100.0)	17 (100.0)	63 (100.0)	0.22	0.52
合計 (%)	4,648 (87.7)	485 (9.2)	95 (1.8)	30 (0.6)	15 (0.3)	25 (0.5)	5,298 (100.0)	3,638 (100.0)	8,936 (100.0)	0.20	0.75
不明 (%)	3 (100.0)						3 (100.0)	2 (100.0)	5 (100.0)		
記載なし (%)											
総計 (%)	4,651 (87.7)	485 (9.1)	95 (1.8)	30 (0.6)	15 (0.3)	25 (0.5)	5,301 (100.0)	3,640 (100.0)	8,941 (100.0)	0.20	0.75

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査