

表 4068 2014年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年) 性別(腹膜透析患者)

性別	0	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	合計	不明 記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	2,917	309	60	23	13	18	3,340	2,402	5,742	0.21	0.84
(%)	(87.3)	(9.3)	(1.8)	(0.7)	(0.4)	(0.5)	(100.0)				
女性	1,734	176	35	7	2	7	1,961	1,238	3,199	0.17	0.59
(%)	(88.4)	(9.0)	(1.8)	(0.4)	(0.1)	(0.4)	(100.0)				
合計	4,651	485	95	30	15	25	5,301	3,640	8,941	0.20	0.75
(%)	(87.7)	(9.1)	(1.8)	(0.6)	(0.3)	(0.5)	(100.0)				
記載なし											
(%)											
総計	4,651	485	95	30	15	25	5,301	3,640	8,941	0.20	0.75
(%)	(87.7)	(9.1)	(1.8)	(0.6)	(0.3)	(0.5)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

\*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査