

表 4080 2014年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年) 併用の状況別 (PD・HD(F)等併用患者)

併用の状況	0	1.0~	2.0~	3.0~	4.0~	5.0~	合計	不明 記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)											
PD単独 (%)											
HD(F)単独.PDカテ あり (%)											
PD.HD併用週1 HD(F) (%)	763 (90.0)	67 (7.9)	9 (1.1)	5 (0.6)	2 (0.2)	2 (0.2)	848 (100.0)	696 (100.0)	1,544	0.15	0.57
PD.HD併用週2 HD(F) (%)	89 (86.4)	12 (11.7)	2 (1.9)				103 (100.0)	38 (100.0)	141	0.16	0.41
PD.HD併用週3 HD(F) (%)											
PD.HD併用週4 HD(F) (%)											
PD.HD併用その他 (%)	38 (82.6)	6 (13.0)	2 (4.3)				46 (100.0)	17 (100.0)	63	0.22	0.52
合計 (%)	890 (89.3)	85 (8.5)	13 (1.3)	5 (0.5)	2 (0.2)	2 (0.2)	997 (100.0)	751 (100.0)	1,748	0.15	0.55
不明 (%)											
記載なし (%)											
総計 (%)	890 (89.3)	85 (8.5)	13 (1.3)	5 (0.5)	2 (0.2)	2 (0.2)	997 (100.0)	751 (100.0)	1,748	0.15	0.55

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査