

表 4085 2014年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年) 医療機関別 (PD・HD(F)等併用患者)

医療機関	0	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	合計	不明 記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	35						35	34	69		
(%)	(100.0)						(100.0)				
私立大学	76	5					81	85	166	0.06	0.24
(%)	(93.8)	(6.2)					(100.0)				
国立	9	1					10	7	17	0.10	0.32
(%)	(90.0)	(10.0)					(100.0)				
県市町村立	130	12	3	1		1	147	119	266	0.18	0.61
(%)	(88.4)	(8.2)	(2.0)	(0.7)		(0.7)	(100.0)				
社会保険	21	3	1				25	24	49	0.20	0.50
(%)	(84.0)	(12.0)	(4.0)				(100.0)				
厚生連	80	9			1		90	42	132	0.14	0.51
(%)	(88.9)	(10.0)			(1.1)		(100.0)				
その他公的	96	15	1	3	1		116	114	230	0.26	0.69
(%)	(82.8)	(12.9)	(0.9)	(2.6)	(0.9)		(100.0)				
私立総合	87	12	4				103	19	122	0.20	0.50
(%)	(84.5)	(11.7)	(3.9)				(100.0)				
私立	162	13	1			1	177	209	386	0.14	0.73
(%)	(91.5)	(7.3)	(0.6)			(0.6)	(100.0)				
私立診療所	194	15	3	1			213	98	311	0.11	0.41
(%)	(91.1)	(7.0)	(1.4)	(0.5)			(100.0)				
総計	890	85	13	5	2	2	997	751	1,748	0.15	0.55
(%)	(89.3)	(8.5)	(1.3)	(0.5)	(0.2)	(0.2)	(100.0)				

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査