

表 4087 2014年中の出口部感染発症率(回/1患者・年) 併用の状況別(腹膜透析患者)

併用の状況	0	1.0~	2.0~	3.0~	4.0~	5.0~	合計	不明 記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)											
PD単独 (%)	3,465 (80.8)	495 (11.5)	159 (3.7)	58 (1.4)	40 (0.9)	72 (1.7)	4,289 (100.0)	2,899 (100.0)	7,188	0.40	1.21
HD(F)単独.PDカテ あり (%)											
PD.HD併用週1 HD(F) (%)	673 (79.8)	105 (12.5)	28 (3.3)	13 (1.5)	8 (0.9)	16 (1.9)	843 (100.0)	701 (100.0)	1,544	0.39	1.08
PD.HD併用週2 HD(F) (%)	78 (77.2)	19 (18.8)	3 (3.0)	1 (1.0)			101 (100.0)	40 (100.0)	141	0.28	0.57
PD.HD併用週3 HD(F) (%)											
PD.HD併用週4 HD(F) (%)											
PD.HD併用その他 (%)	42 (93.3)	1 (2.2)	2 (4.4)				45 (100.0)	18 (100.0)	63	0.11	0.44
合計 (%)	4,258 (80.7)	620 (11.7)	192 (3.6)	72 (1.4)	48 (0.9)	88 (1.7)	5,278 (100.0)	3,658 (100.0)	8,936	0.40	1.17
不明 (%)	2 (66.7)					1 (33.3)	3 (100.0)	2 (100.0)	5	2.00	3.46
記載なし (%)											
総計 (%)	4,260 (80.7)	620 (11.7)	192 (3.6)	72 (1.4)	48 (0.9)	89 (1.7)	5,281 (100.0)	3,660 (100.0)	8,941	0.40	1.18

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査