

表 4090 2014年中の出口部感染発症率(回/1患者・年) 現在施行中のPD歴(年)別(腹膜透析患者)

現在施行中のPD 歴	0	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	合計	不明 記載なし	総計	平均	標準偏差
1年未満	989	75	42	21	22	33	1,182	111	1,293	0.53	1.64
(%)	(83.7)	(6.3)	(3.6)	(1.8)	(1.9)	(2.8)	(100.0)				
1年～	765	150	41	17	9	13	995	56	1,051	0.41	1.03
(%)	(76.9)	(15.1)	(4.1)	(1.7)	(0.9)	(1.3)	(100.0)				
2年～	1,117	199	55	12	7	19	1,409	105	1,514	0.36	0.99
(%)	(79.3)	(14.1)	(3.9)	(0.9)	(0.5)	(1.3)	(100.0)				
4年～	665	98	27	16	7	17	830	38	868	0.41	1.18
(%)	(80.1)	(11.8)	(3.3)	(1.9)	(0.8)	(2.0)	(100.0)				
6年～	354	45	14	3	2	3	421	30	451	0.26	0.77
(%)	(84.1)	(10.7)	(3.3)	(0.7)	(0.5)	(0.7)	(100.0)				
8年～	170	21	6			1	198	15	213	0.20	0.61
(%)	(85.9)	(10.6)	(3.0)			(0.5)	(100.0)				
10年～	199	32	7	3	1	3	245	10	255	0.31	0.82
(%)	(81.2)	(13.1)	(2.9)	(1.2)	(0.4)	(1.2)	(100.0)				
合計	4,259	620	192	72	48	89	5,280	365	5,645	0.40	1.18
(%)	(80.7)	(11.7)	(3.6)	(1.4)	(0.9)	(1.7)	(100.0)				
記載なし	1						1	3,295	3,296		
(%)	(100.0)						(100.0)				
総計	4,260	620	192	72	48	89	5,281	3,660	8,941	0.40	1.18
(%)	(80.7)	(11.7)	(3.6)	(1.4)	(0.9)	(1.7)	(100.0)				
平均	3.43	3.59	3.16	2.87	2.13	2.51	3.41	2.96	3.38		
標準偏差	3.32	2.98	2.84	2.97	2.53	2.59	3.25	3.09	3.24		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査