

表 4098 2014年中の出口部感染発症率(回/1患者・年) 医療機関別(腹膜透析単独患者)

医療機関	0	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	合計	不明 記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	314	59	16	5	3	4	401	240	641	0.38	1.03
(%)	(78.3)	(14.7)	(4.0)	(1.2)	(0.7)	(1.0)	(100.0)				
私立大学	459	55	18	12	5	3	552	415	967	0.33	0.94
(%)	(83.2)	(10.0)	(3.3)	(2.2)	(0.9)	(0.5)	(100.0)				
国立	111	9	6	2	1	2	131	54	185	0.42	1.60
(%)	(84.7)	(6.9)	(4.6)	(1.5)	(0.8)	(1.5)	(100.0)				
県市町村立	649	73	24	5	6	8	765	555	1,320	0.27	0.83
(%)	(84.8)	(9.5)	(3.1)	(0.7)	(0.8)	(1.0)	(100.0)				
社会保険	127	26	6	4	1	5	169	269	438	0.56	1.45
(%)	(75.1)	(15.4)	(3.6)	(2.4)	(0.6)	(3.0)	(100.0)				
厚生連	247	34	3	3	1	1	289	205	494	0.21	0.65
(%)	(85.5)	(11.8)	(1.0)	(1.0)	(0.3)	(0.3)	(100.0)				
その他公的	588	69	27	9	2	7	702	387	1,089	0.32	1.07
(%)	(83.8)	(9.8)	(3.8)	(1.3)	(0.3)	(1.0)	(100.0)				
私立総合	158	44	2	1		3	208	46	254	0.39	1.25
(%)	(76.0)	(21.2)	(1.0)	(0.5)		(1.4)	(100.0)				
私立	536	78	39	13	15	24	705	597	1,302	0.61	1.53
(%)	(76.0)	(11.1)	(5.5)	(1.8)	(2.1)	(3.4)	(100.0)				
私立診療所	276	48	18	4	6	15	367	131	498	0.67	1.75
(%)	(75.2)	(13.1)	(4.9)	(1.1)	(1.6)	(4.1)	(100.0)				
総計	3,465	495	159	58	40	72	4,289	2,899	7,188	0.40	1.21
(%)	(80.8)	(11.5)	(3.7)	(1.4)	(0.9)	(1.7)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査