

表 4100 2014年中の出口部感染発症率(回/1患者・年) 併用の状況別 (PD・HD(F)等併用患者)

併用の状況	0	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	合計	不明 記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)											
PD単独 (%)											
HD(F)単独.PDカテ あり (%)											
PD.HD併用週1 HD(F) (%)	673 (79.8)	105 (12.5)	28 (3.3)	13 (1.5)	8 (0.9)	16 (1.9)	843 (100.0)	701	1,544	0.39	1.08
PD.HD併用週2 HD(F) (%)	78 (77.2)	19 (18.8)	3 (3.0)	1 (1.0)			101 (100.0)	40	141	0.28	0.57
PD.HD併用週3 HD(F) (%)											
PD.HD併用週4 HD(F) (%)											
PD.HD併用その他 (%)	42 (93.3)	1 (2.2)	2 (4.4)				45 (100.0)	18	63	0.11	0.44
合計 (%)	793 (80.2)	125 (12.6)	33 (3.3)	14 (1.4)	8 (0.8)	16 (1.6)	989 (100.0)	759	1,748	0.37	1.02
不明 (%)											
記載なし (%)											
総計 (%)	793 (80.2)	125 (12.6)	33 (3.3)	14 (1.4)	8 (0.8)	16 (1.6)	989 (100.0)	759	1,748	0.37	1.02

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査