

表 4106 PET Cr D/P比 治療方法(新分類)別(腹膜透析患者)

治療方法 (新分類)	0.5未満	0.5~	0.65~	0.81~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)	186 (11.3)	623 (37.9)	642 (39.1)	192 (11.7)	1,643 (100.0)	3,378	5,021	0.65	0.14
腹膜透析 (APD) (%)	88 (8.8)	351 (35.0)	405 (40.4)	159 (15.9)	1,003 (100.0)	1,836	2,839	0.67	0.14
腹膜透析 (CCPD) (%)	38 (8.4)	164 (36.3)	193 (42.7)	57 (12.6)	452 (100.0)	629	1,081	0.66	0.14
合計 (%)	312 (10.1)	1,138 (36.7)	1,240 (40.0)	408 (13.2)	3,098 (100.0)	5,843	8,941	0.65	0.14
記載なし (%)									
総計 (%)	312 (10.1)	1,138 (36.7)	1,240 (40.0)	408 (13.2)	3,098 (100.0)	5,843	8,941	0.65	0.14

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査