

表 4107 PET Cr D/P比 併用の状況別（腹膜透析患者）

併用の状況	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)									
PD単独 (%)	239 (9.5)	900 (35.8)	1,039 (41.3)	335 (13.3)	2,513 (100.0)	4,675	7,188	0.66	0.14
HD(F)単独.PDカテ あり (%)									
PD.HD併用週1 HD(F) (%)	53 (10.6)	202 (40.3)	176 (35.1)	70 (14.0)	501 (100.0)	1,043	1,544	0.65	0.14
PD.HD併用週2 HD(F) (%)	17 (26.2)	31 (47.7)	16 (24.6)	1 (1.5)	65 (100.0)	76	141	0.57	0.14
PD.HD併用週3 HD(F) (%)									
PD.HD併用週4 HD(F) (%)									
PD.HD併用その他 (%)	3 (16.7)	5 (27.8)	8 (44.4)	2 (11.1)	18 (100.0)	45	63	0.66	0.15
合計 (%)	312 (10.1)	1,138 (36.7)	1,239 (40.0)	408 (13.2)	3,097 (100.0)	5,839	8,936	0.65	0.14
不明 (%)			1 (100.0)		1 (100.0)	4	5	0.66	
記載なし (%)									
総計 (%)	312 (10.1)	1,138 (36.7)	1,240 (40.0)	408 (13.2)	3,098 (100.0)	5,843	8,941	0.65	0.14

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査