

表 4117 PET Cr D/P比 脳梗塞の既往別（腹膜透析患者）

| 脳梗塞の既往 | 0.5未満 | 0.5～ | 0.65～ | 0.81～ | 合計 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 |
|-------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| 既往なし (%) | 266 (93.0) | 933 (90.7) | 1,006 (89.4) | 329 (88.0) | 2,534 (90.0) | 2,690 (85.6) | 5,224 (87.7) | 0.65 | 0.14 |
| 既往あり (%) | 20 (7.0) | 96 (9.3) | 119 (10.6) | 45 (12.0) | 280 (10.0) | 454 (14.4) | 734 (12.3) | 0.67 | 0.14 |
| 合計 (%) | 286 (100.0) | 1,029 (100.0) | 1,125 (100.0) | 374 (100.0) | 2,814 (100.0) | 3,144 (100.0) | 5,958 (100.0) | 0.65 | 0.14 |
| 不明 | 1 | | 1 | | 2 | 35 | 37 | 0.58 | 0.27 |
| 記載なし | 25 | 109 | 114 | 34 | 282 | 2,664 | 2,946 | 0.65 | 0.12 |
| 総計 | 312 | 1,138 | 1,240 | 408 | 3,098 | 5,843 | 8,941 | 0.65 | 0.14 |

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査