

表 4127 PET Cr D/P比 クレアチニン濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

クレアチニン 濃度	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2未満 (%)		1 (50.0)	1 (50.0)		2 (100.0)	15	17	0.68	0.14
2～ (%)	8 (16.7)	19 (39.6)	16 (33.3)	5 (10.4)	48 (100.0)	106	154	0.62	0.14
4～ (%)	25 (11.8)	71 (33.5)	84 (39.6)	32 (15.1)	212 (100.0)	363	575	0.66	0.14
6～ (%)	43 (8.6)	176 (35.3)	204 (41.0)	75 (15.1)	498 (100.0)	635	1,133	0.66	0.14
8～ (%)	56 (8.5)	228 (34.5)	281 (42.6)	95 (14.4)	660 (100.0)	689	1,349	0.67	0.13
10～ (%)	45 (7.8)	205 (35.5)	248 (43.0)	79 (13.7)	577 (100.0)	538	1,115	0.67	0.13
12～ (%)	35 (9.1)	143 (37.3)	155 (40.5)	50 (13.1)	383 (100.0)	465	848	0.66	0.14
14～ (%)	32 (12.4)	104 (40.3)	91 (35.3)	31 (12.0)	258 (100.0)	230	488	0.64	0.13
16～ (%)	25 (20.5)	44 (36.1)	39 (32.0)	14 (11.5)	122 (100.0)	173	295	0.61	0.16
合計 (%)	269 (9.7)	991 (35.9)	1,119 (40.5)	381 (13.8)	2,760 (100.0)	3,214	5,974	0.66	0.14
記載なし (%)	43 (12.7)	147 (43.5)	121 (35.8)	27 (8.0)	338 (100.0)	2,629	2,967	0.62	0.16
総計 (%)	312 (10.1)	1,138 (36.7)	1,240 (40.0)	408 (13.2)	3,098 (100.0)	5,843	8,941	0.65	0.14
平均	10.55	10.18	9.98	9.93	10.10	9.70	9.89		
標準偏差	4.01	3.33	3.23	3.27	3.35	3.66	3.53		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査