

表 4128 PET Cr D/P比 アルブミン濃度(g/dL)別 (腹膜透析患者)

アルブミン 濃度	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)			1 (50.0)	1 (50.0)	2 (100.0)	13	15	0.76	0.16
1.5～ (%)		1 (4.8)	13 (61.9)	7 (33.3)	21 (100.0)	50	71	0.77	0.08
2.0～ (%)	5 (4.6)	23 (21.3)	47 (43.5)	33 (30.6)	108 (100.0)	190	298	0.74	0.14
2.5～ (%)	16 (3.5)	122 (26.7)	213 (46.6)	106 (23.2)	457 (100.0)	580	1,037	0.71	0.13
3.0～ (%)	82 (8.0)	355 (34.7)	447 (43.7)	139 (13.6)	1,023 (100.0)	1,135	2,158	0.66	0.14
3.5～ (%)	116 (12.7)	383 (41.9)	334 (36.6)	80 (8.8)	913 (100.0)	993	1,906	0.63	0.13
4.0～ (%)	49 (22.7)	97 (44.9)	58 (26.9)	12 (5.6)	216 (100.0)	215	431	0.60	0.12
4.5～ (%)	2 (18.2)	7 (63.6)	2 (18.2)		11 (100.0)	10	21	0.58	0.10
5.0～ (%)			1 (100.0)		1 (100.0)	1	2	0.79	
合計 (%)	270 (9.8)	988 (35.9)	1,116 (40.6)	378 (13.7)	2,752 (100.0)	3,187	5,939	0.66	0.14
記載なし (%)	42 (12.1)	150 (43.4)	124 (35.8)	30 (8.7)	346 (100.0)	2,656	3,002	0.62	0.15
総計 (%)	312 (10.1)	1,138 (36.7)	1,240 (40.0)	408 (13.2)	3,098 (100.0)	5,843	8,941	0.65	0.14
平均	3.57	3.42	3.25	3.07	3.32	3.24	3.28		
標準偏差	0.46	0.45	0.48	0.52	0.50	0.54	0.52		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査