

表 4134 PET Cr D/P比 ヘモグロビン濃度(g/dL)別（腹膜透析患者）

ヘモグロビン 濃度	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
5未満 (%)				1 (100.0)	1 (100.0)	6	7	0.93	
5～ (%)			2 (40.0)	3 (60.0)	5 (100.0)	9	14	0.80	0.10
6～ (%)		4 (40.0)	4 (40.0)	2 (20.0)	10 (100.0)	18	28	0.72	0.12
7～ (%)	4 (14.3)	8 (28.6)	12 (42.9)	4 (14.3)	28 (100.0)	96	124	0.67	0.13
8～ (%)	10 (7.9)	44 (34.9)	52 (41.3)	20 (15.9)	126 (100.0)	218	344	0.67	0.15
9～ (%)	33 (8.6)	113 (29.5)	161 (42.0)	76 (19.8)	383 (100.0)	520	903	0.68	0.14
10～ (%)	66 (8.0)	285 (34.4)	367 (44.3)	110 (13.3)	828 (100.0)	878	1,706	0.67	0.14
11～ (%)	91 (10.6)	330 (38.6)	330 (38.6)	104 (12.2)	855 (100.0)	854	1,709	0.65	0.13
12～ (%)	42 (11.4)	146 (39.7)	141 (38.3)	39 (10.6)	368 (100.0)	428	796	0.64	0.12
13～ (%)	15 (14.6)	40 (38.8)	37 (35.9)	11 (10.7)	103 (100.0)	134	237	0.62	0.16
14～ (%)	8 (25.0)	13 (40.6)	6 (18.8)	5 (15.6)	32 (100.0)	47	79	0.61	0.15
合計 (%)	269 (9.8)	983 (35.9)	1,112 (40.6)	375 (13.7)	2,739 (100.0)	3,208	5,947	0.66	0.14
記載なし (%)	43 (12.0)	155 (43.2)	128 (35.7)	33 (9.2)	359 (100.0)	2,635	2,994	0.63	0.15
総計 (%)	312 (10.1)	1,138 (36.7)	1,240 (40.0)	408 (13.2)	3,098 (100.0)	5,843	8,941	0.65	0.14
平均	11.14	11.02	10.82	10.65	10.90	10.73	10.81		
標準偏差	1.33	1.27	1.24	1.45	1.30	1.51	1.42		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査