

表 4135 PET Cr D/P比 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

総コレステロール濃度	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満	1	6	11	6	24	26	50	0.71	0.12
(%)	(4.2)	(25.0)	(45.8)	(25.0)	(100.0)				
100～	5	23	35	11	74	86	160	0.67	0.15
(%)	(6.8)	(31.1)	(47.3)	(14.9)	(100.0)				
120～	21	78	93	29	221	227	448	0.66	0.13
(%)	(9.5)	(35.3)	(42.1)	(13.1)	(100.0)				
140～	46	137	151	57	391	415	806	0.66	0.14
(%)	(11.8)	(35.0)	(38.6)	(14.6)	(100.0)				
160～	36	154	180	55	425	440	865	0.66	0.15
(%)	(8.5)	(36.2)	(42.4)	(12.9)	(100.0)				
180～	44	160	168	63	435	398	833	0.66	0.13
(%)	(10.1)	(36.8)	(38.6)	(14.5)	(100.0)				
200～	36	100	110	47	293	271	564	0.66	0.15
(%)	(12.3)	(34.1)	(37.5)	(16.0)	(100.0)				
220～	15	63	60	18	156	162	318	0.66	0.13
(%)	(9.6)	(40.4)	(38.5)	(11.5)	(100.0)				
240～	9	26	32	4	71	88	159	0.63	0.13
(%)	(12.7)	(36.6)	(45.1)	(5.6)	(100.0)				
260～	7	22	36	13	78	71	149	0.68	0.13
(%)	(9.0)	(28.2)	(46.2)	(16.7)	(100.0)				
合計	220	769	876	303	2,168	2,184	4,352	0.66	0.14
(%)	(10.1)	(35.5)	(40.4)	(14.0)	(100.0)				
記載なし	92	369	364	105	930	3,659	4,589	0.65	0.14
(%)	(9.9)	(39.7)	(39.1)	(11.3)	(100.0)				
総計	312	1,138	1,240	408	3,098	5,843	8,941	0.65	0.14
(%)	(10.1)	(36.7)	(40.0)	(13.2)	(100.0)				
平均	180.80	179.75	179.68	178.97	179.72	178.31	179.01		
標準偏差	37.66	39.26	42.55	41.17	40.71	40.37	40.54		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査