

表 4136 PET Cr D/P比 HDL-C濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

HDL-C濃度	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)			2 (100.0)		2 (100.0)	6	8	0.76	0.05
20～ (%)	16 (10.9)	59 (40.1)	58 (39.5)	14 (9.5)	147 (100.0)	141	288	0.64	0.13
30～ (%)	61 (12.9)	177 (37.5)	194 (41.1)	40 (8.5)	472 (100.0)	461	933	0.63	0.15
40～ (%)	53 (10.7)	194 (39.0)	190 (38.2)	60 (12.1)	497 (100.0)	493	990	0.65	0.13
50～ (%)	36 (8.4)	149 (34.9)	170 (39.8)	72 (16.9)	427 (100.0)	412	839	0.67	0.13
60～ (%)	23 (8.0)	84 (29.4)	120 (42.0)	59 (20.6)	286 (100.0)	230	516	0.69	0.13
70～ (%)	9 (6.7)	46 (34.1)	53 (39.3)	27 (20.0)	135 (100.0)	124	259	0.68	0.14
80～ (%)	5 (6.2)	29 (35.8)	33 (40.7)	14 (17.3)	81 (100.0)	60	141	0.69	0.13
90～ (%)	3 (9.1)	14 (42.4)	13 (39.4)	3 (9.1)	33 (100.0)	28	61	0.66	0.14
100～ (%)	2 (6.5)	13 (41.9)	11 (35.5)	5 (16.1)	31 (100.0)	26	57	0.69	0.15
合計 (%)	208 (9.9)	765 (36.2)	844 (40.0)	294 (13.9)	2,111 (100.0)	1,981	4,092	0.66	0.14
記載なし (%)	104 (10.5)	373 (37.8)	396 (40.1)	114 (11.6)	987 (100.0)	3,862	4,849	0.65	0.14
総計 (%)	312 (10.1)	1,138 (36.7)	1,240 (40.0)	408 (13.2)	3,098 (100.0)	5,843	8,941	0.65	0.14
平均	48.11	50.42	50.63	55.39	50.97	49.95	50.47		
標準偏差	16.60	18.63	18.10	17.78	18.19	17.19	17.72		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査