

表 4138 PET Cr D/P比 収縮期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

収縮期血圧	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)		1 (100.0)			1 (100.0)		1	0.57	
60～ (%)			4 (80.0)	1 (20.0)	5 (100.0)	8	13	0.74	0.08
80～ (%)	8 (14.8)	21 (38.9)	18 (33.3)	7 (13.0)	54 (100.0)	70	124	0.65	0.13
100～ (%)	43 (13.2)	129 (39.6)	117 (35.9)	37 (11.3)	326 (100.0)	315	641	0.64	0.14
120～ (%)	75 (9.5)	308 (39.0)	305 (38.6)	102 (12.9)	790 (100.0)	726	1,516	0.65	0.13
140～ (%)	75 (9.1)	281 (34.3)	344 (42.0)	120 (14.6)	820 (100.0)	759	1,579	0.66	0.14
160～ (%)	26 (7.2)	123 (33.9)	161 (44.4)	53 (14.6)	363 (100.0)	358	721	0.68	0.13
180～ (%)	15 (13.3)	34 (30.1)	45 (39.8)	19 (16.8)	113 (100.0)	104	217	0.67	0.13
200～ (%)		7 (58.3)	4 (33.3)	1 (8.3)	12 (100.0)	19	31	0.65	0.08
220～ (%)		1 (20.0)	2 (40.0)	2 (40.0)	5 (100.0)	5	10	0.78	0.17
合計 (%)	242 (9.7)	905 (36.4)	1,000 (40.2)	342 (13.7)	2,489 (100.0)	2,364	4,853	0.66	0.14
記載なし (%)	70 (11.5)	233 (38.3)	240 (39.4)	66 (10.8)	609 (100.0)	3,479	4,088	0.64	0.15
総計 (%)	312 (10.1)	1,138 (36.7)	1,240 (40.0)	408 (13.2)	3,098 (100.0)	5,843	8,941	0.65	0.14
平均	139.46	139.66	141.83	143.37	141.02	140.99	141.01		
標準偏差	23.17	22.54	22.22	23.20	22.60	23.18	22.88		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査