

表 4139 PET Cr D/P比 拡張期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

拡張期血圧	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)				1 (100.0)	1 (100.0)		1	0.84	
20～ (%)		2 (40.0)	3 (60.0)		5 (100.0)	10	15	0.64	0.06
40～ (%)	17 (10.0)	64 (37.6)	71 (41.8)	18 (10.6)	170 (100.0)	205	375	0.65	0.14
60～ (%)	103 (9.8)	370 (35.3)	430 (41.1)	144 (13.8)	1,047 (100.0)	1,018	2,065	0.66	0.14
80～ (%)	61 (9.1)	249 (37.2)	261 (39.0)	98 (14.6)	669 (100.0)	627	1,296	0.66	0.13
90～ (%)	30 (7.6)	149 (37.7)	166 (42.0)	50 (12.7)	395 (100.0)	319	714	0.66	0.13
100～ (%)	28 (16.1)	66 (37.9)	57 (32.8)	23 (13.2)	174 (100.0)	173	347	0.64	0.14
120～ (%)	2 (25.0)		4 (50.0)	2 (25.0)	8 (100.0)	10	18	0.69	0.16
140～ (%)			1 (100.0)		1 (100.0)		1	0.75	
合計 (%)	241 (9.8)	900 (36.4)	993 (40.2)	336 (13.6)	2,470 (100.0)	2,362	4,832	0.66	0.14
記載なし (%)	71 (11.3)	238 (37.9)	247 (39.3)	72 (11.5)	628 (100.0)	3,481	4,109	0.64	0.15
総計 (%)	312 (10.1)	1,138 (36.7)	1,240 (40.0)	408 (13.2)	3,098 (100.0)	5,843	8,941	0.65	0.14
平均	80.80	79.52	78.99	79.90	79.48	78.52	79.01		
標準偏差	15.41	13.79	14.04	14.17	14.11	14.75	14.43		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査