

表 4143 PET Cr D/P比 一日透析液使用量(L/日)別（腹膜透析患者）

一日透析液使用量	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2未満	12	19	16	10	57	62	119	0.64	0.17
(%)	(21.1)	(33.3)	(28.1)	(17.5)	(100.0)				
2～	20	60	69	30	179	214	393	0.66	0.15
(%)	(11.2)	(33.5)	(38.5)	(16.8)	(100.0)				
4～	66	212	240	78	596	476	1,072	0.66	0.14
(%)	(11.1)	(35.6)	(40.3)	(13.1)	(100.0)				
6～	98	402	414	136	1,050	745	1,795	0.66	0.14
(%)	(9.3)	(38.3)	(39.4)	(13.0)	(100.0)				
8～	70	285	325	102	782	624	1,406	0.66	0.14
(%)	(9.0)	(36.4)	(41.6)	(13.0)	(100.0)				
10～	25	84	97	28	234	176	410	0.65	0.14
(%)	(10.7)	(35.9)	(41.5)	(12.0)	(100.0)				
12～	11	40	46	16	113	88	201	0.64	0.18
(%)	(9.7)	(35.4)	(40.7)	(14.2)	(100.0)				
合計	302	1,102	1,207	400	3,011	2,385	5,396	0.66	0.14
(%)	(10.0)	(36.6)	(40.1)	(13.3)	(100.0)				
記載なし	10	36	33	8	87	3,458	3,545	0.64	0.14
(%)	(11.5)	(41.4)	(37.9)	(9.2)	(100.0)				
総計	312	1,138	1,240	408	3,098	5,843	8,941	0.65	0.14
(%)	(10.1)	(36.7)	(40.0)	(13.2)	(100.0)				
平均	6.64	6.86	6.92	6.78	6.85	6.70	6.78		
標準偏差	2.78	2.49	2.54	2.54	2.55	2.91	2.71		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査